



पत्र सख्या : ०७९।०८०
च.नं.

साकेला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मानेभन्ज्याङ खोटाङ
साकेला गाउँपालिकाको कार्यालय
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
मानेभन्ज्याङ, खोटाङ, १ नं. वडा नगर
स्था: २०७३

कोशी, प्रदेश नेपाल

मिति: २०८०/०२/०३

गाईभैसीमा लाग्ने लम्पी स्किन डिजिज सम्बन्धि जानकारीमुलक सुचना !!!

उपरोक्त सम्बन्धमा यस साकेला गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूको गाईभैसीहरूमा भाईसबाट लाग्ने लम्पी स्किन डिजिज (Lumpy Skin Disease) संग मिल्दोजुल्दो संकास्पद लक्षण देखा परेकोले यस रोगबाट आफ्नो पशुहरूलाई सुरक्षित राख्न सावधानी अपनाउनु हुन सबै पशुपालक कृषक तथा सरोकारवालाहरूमा अनुरोध गरिन्छ।



रोगका लक्षणहरू:

१. गाई भैसीमा ज्वरो सहित विभिन्न भागहरूमा गिर्खा तथा गाठगुठी देखिने र गाठगुठीहरूबाट पानी बग्ने र पाक्ने।
२. पशु छटपटाउने र दुब्लाउदै जाने।
३. दुध उत्पादन करिव ८०% घट्ने।
४. गर्भ तुहिने र मृत्यु समेत हुन सक्ने।
५. शरिरका विभिन्न भागहरूमा पैसा जस्तो दागहरू देखा पर्ने।
६. आखावाट कचेरा निकाल्ने, सिमान बग्ने तथा फिज धेरै निकाल्ने र पशुहरूको वजन घट्दै जाने।
७. लिम्फनोडहरू सुनिने।


रोग सन्ने माध्यम

१. लामखुट्टे, भुसुना, झिँगा आदिको टिकाईबाट।
२. संक्रमित गाईभैसीको ओसारपोसार र लसपसबाट।

उपचार तथा रोकथामका उपायहरू

१. ठोस उपचारहरू नभएकोले लक्षण अनुसार उपचार गर्ने।
२. संक्रमित क्षेत्रबाट गाईभैसी ओसारपोसार नगर्ने।
३. लामखुट्टे, भुसुना, झिँगा आदिको नियन्त्रण गर्ने र गोठ वरपरको वातावरण सुख्खा र सफा राख्ने।
४. गोठ र मलखाद (भकारो) को दुरी कमिमा १० मिटर कायम राख्ने।
५. पशुहरूमा रोगको लक्षण देखिएमा रोगी पशुहरूलाई वधानबाट अलग्गै राख्ने व्यवस्था मिलाउने।
६. अनावश्यक व्यक्तिहरू गोठमा आवतजावत बन्द गर्ने।

माथि उल्लेखित लक्षणसंग मिल्दोजुल्दो रोग देखिएमा साकेला गाउँपालिका पशु सेवा शाखामा जानकारी गराउनुहुन सम्पूर्ण कृषकहरूमा अनुरोध छ। सम्पर्कको लागि: ९८६७८०८३११, ९८४४५५४००२, ९८४२९०५७२८, ९७६२२१७९०८


महेश राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

“व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन”

www.sakelamun.gov.np | ito.sakelarmun@gmail.com

लम्पी स्किन रोगबारे जानकारी

परिचय

- यो रोग गाईभैसीमा देखिन्छ।
- यो रोग मानिसहरूलाई सार्दैन।
- गर्मी मौसममा टोक्ने झिंगा (डोस), लामखुटे, किर्ना जस्ता किराहरूको संख्या बढी हुने तथा थप सक्रिय हुने हुनाले यस रोगको प्रकोप बढी देखिन्छ।
- दूध उत्पादनमा तीव्र गिरावट आउँदछ।
- प्रजनन समस्या आउने तथा गर्भपतन हुन सक्दछ।
- भैसीको छालाको गुणस्तरमा ह्रास आउँदछ।
- वजन घट्ने र कहिलेकाहीँ मृत्यु समेत हुन सक्दछ।
- गाईभैसीहरूको ओसारपसार तथा व्यापारमा प्रतिबन्ध गर्नु पर्ने हुँदा थप आर्थिक नोक्सानी हुने गर्दछ।

लक्षणहरू

- संक्रमित गाईभैसीले निम्न अनुसारका लक्षणहरू देखाउँदछन्।
- उच्च ज्वरो (१०४ डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि), दाना पानी कम खाने र दूध उत्पादन घट्दछ।
 - छालामा १-५ सेन्टिमिटरको साह्रो गोला गिर्खाहरू (सामान्यतया सुरुमा टाउको र घाँटीमा) देखिन्छ। लामो रौ भएको गाईभैसीमा गिर्खाहरू सजिलै देखिदैनन्। जिउ छाम्दा तथा पानीले भिजेको अवस्थामा मात्र पत्ता लगाउन सकिन्छ।
 - सामान्य संक्रमणमा गिर्खाहरूको संख्या थोरै र गम्भीर संक्रमणहरूमा पूरै शरीर ढाकी गरी हुन सक्दछ।
 - गिर्खाहरू केही समय पछि हराउन सक्छन् तर कहिलेकाहीँ गिर्खाहरू फुटेर गहिरो घाउ भई किरा तथा झिंगाहरूले (औसा) घाउलाई थप जटिल बनाउन सक्दछन्।
 - धुतुनो, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिन्छन्।
 - अँखा र नाकबाट अत्यधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउछ।
 - न्याल काँदछ।
 - लिम्फ नोडहरू सुत्रिने हुन्छ।
 - केही संक्रमित गाईभैसीहरूले कुनै पनि लक्षण नदेखाउन सक्छन्।



शरीरभरि गिर्खा देखिएको गाई

रोग सर्ने तरिका

- संक्रमित लामखुटे, टोक्ने झिंगा र किर्ना जस्ता किराहरूको टोकाइबाट,
- संक्रमित गाईवस्तुहरूको ओसारपसारबाट,
- सामुदायिक चरन क्षेत्र तथा दाना तथा पानी खाने ठाउँहरूबाट,
- प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भाधानबाट,
- पशु उपचार गर्ने क्रममा फरक गाईभैसीहरूमा एउटै सुइको प्रयोगबाट,
- कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट



भैसीको शरीरभरि साना साना गिर्खाहरू देखिएको



पछाडिको भाग र धुन वरिपरि गिर्खा देखिएको

उपचार

यो रोगको प्रभावकारी उपचार छैन। रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो।

रोगको शंका लागेमा के गर्ने ?

- रोगको प्रकोपको समयमा वा जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पर्ने गाईभैसीहरूको दैनिक निरीक्षण गर्नु पर्छ।
- पशुहरूलाई रोग लागेको शंका भएमा तुरुन्त प्राविधिक, स्थानीय तहको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायलाई जानकारी दिनुहोस।
- लम्पी स्किन रोग भएको अवस्थामा रोग देखिएको क्षेत्रबाट पशुहरूको ओसारपसार तुरुन्त रोक्नु पर्छ।

फार्मको सुरक्षा कसरी गर्ने ?

1. खोप लगाएर- प्रभावकारी खोप लगाएको तीन हप्ता भित्रमा रोग विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुन्छ।
 - संक्रमित हुनु अघि नै गाईभैसीलाई खोप लगाउनु पर्छ।
 - खोपले कहिलेकाहीँ केही गाईभैसीमा निम्न अनुसारका प्रतिक्रियाहरू देखाउन सक्छ:
 - खोप लगाएको ठाउँमा हलुका सुनिन्छ जुन १-२ हप्ता भित्रमा आफै हराएर जान्छ।
 - छोटो समयको लागि ज्वरो आउनुका साथै केही दिन दूध उत्पादन घट्न सक्दछ।
 - शरीर वा धुनमा साना गिर्खाहरू देखिन सक्छ जुन छिट्टै हराउँदछन्।
2. विश्वसनीय स्रोतहरूबाट गाईभैसी खरिद गर्नुपर्दछ। गाईभैसी खरिद गरी ल्याएमा २८ दिनसम्म बथानबाट अलग राख्नुपर्दछ। रोगको प्रकोपको समय रोग लागेको ठाउँबाट गाईभैसी ल्याउनु हुँदैन।
3. गोठलाई झिंगा, लामखुटे तथा अन्य किराहरूबाट मुक्त राख्न सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्दछ र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कीट विकर्षकको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
4. गोठ वरिपरि पानी जम्न दिन हुँदैन।
5. फार्ममा जैविक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ।



गिर्खा फुटेपछिको घाउ

थप जानकारीका लागि
पशु सेवा विभाग, हरिहरभवन
 फोन नं. ०१-५५२१६१०, ०१-५५२५४७८, ०१-५५२२०५६
 वेब: www.dls.gov.np